



birdingtours GmbH
Kreuzmattenstr. 10a, 79423 Heitersheim
07634-5049845
www.birdingtours.de
info@birdingtours.de

Abendteuer Nordindien

Bunte Vielfalt, Tiger und Taj Mahal

24 November – 11 Dezember 2024

mit birdingtours und Markus Lilje




Die Reise startete am südwestlichen Rand der Metropole Delhi. Wir haben zwei verschiedene Orte zum birden besucht. Nach dem Frühstück fuhren wir zum Sultanpur Nationalpark, stoppten aber als erstes in der Nähe von Budherakanal. Es ging gleich gut los und wir konnten sehen, welche beeindruckende Artenvielfalt in dieser Gegend vorkommt. Ein Blaukehlchen begrüßte uns gleich und wir sahen in der nächsten Stunde viele schöne Arten, manche die wir oft auf der Tiefebene begegnen würden, wie Schachwürger, Graukopf-Purpurhühner, die ersten endemischen Indien-Fleckschnabelenten, Heckenkuckuck, Fasanenblatthühnchen, Warzenibis, Rohrweihe, Wiedehopf, Braunliet, Wendehals, Königsdrongo, Rostbauchprinie, 4 verschiedene Stare, Strauchschmätzer, Muskatbronzemännchen, sowie verschiedene Stelzen und Schwalben.



In dem nahegelegenen Sultanpur selbst gab es dann auch viel zu sehen, mit brütenden Bunt- und Riesenstörchen, vielen Reiher, 3 Kormorane, Saruskranich, verschiedene Limikolen, Weißschwanzkiebitz, Zwergadler, Adlerbussard. Etwas weiter entfernt vom Wasser gab es ebenfalls viel zu sehen: wir hatten die ersten Brahmakauz, Indien-Zwergohreule, bunte

Alexandersittich, Bonzescheitel-Smaragdspint, Bengalenspecht, Zwergmenningvogel, Indiensilberschnabel und ein überraschende Jakobinerkuckuck.

Nach einem späten Mittag stürzten wir uns dann in den chaotischen und faszinierenden Verkehr von Delhi. Der Abend endete dann am Bahnhof von Old Delhi, wo wir in unseren Nachtzug in das Himalaya Vorgebirge einstiegen. Leider ging das gefühlt nicht weniger chaotisch weiter als im Verkehr von Delhi. Mit weniger Schlaf als gehofft, kamen wir dann sehr früh in der frischen Luft in der Nähe vom Corbett Nationalpark an. Als wir uns etwas sortiert hatten und ein paar logistische Herausforderungen im Griff hatten, konnten wir uns auf den Weg machen, diese völlig andere Vogelwelt kennenzulernen.



Der Kosifluss in dieser Gegend ist eine wunderbare Basis und erlaubt Zugang zu verschiedenen Biotopen in der Umgebung. Der Flu selbst ist aber auch interessant und hat 2 der größten Vogelziele der ganzen Tour. Auf der Suche nach diesen Arten fanden wir schon Flußkiebitz, Weißscheitel- und Wasserrotschwänze, Haubenfischer und Haubenschlangenadler...und dann hatten wir den einzigartigen Ibisschnabel vor uns im Spektiv, aktiv

fressend am Rande des Flusses. Dann wurden wir plötzlich von einem Mauerläufer abgelenkt, der hier interessanterweise auf den kleinen runden Flusssteinen lebt, statt wie mehr bekannt auf senkrechten Steinen und Felsen.

Über die nächsten 3 Tage haben wir viel Zeit in dieser Umgebung verbracht, im Corbett Nationalpark, sowie auch in den Wäldern am Rande vom Park. Im Park waren wir in 3 verschiedenen Zonen: Dhikala, Jhirna und Bijrani – alle anders und alle interessant mit schönen Wäldern, Flüssen und offenen Graslandschaften. Hier gibt es eine riesige Diversität



an Arten und wir haben ganz viele Spuren im Sand gesehen - größere Tiere die sich auch gezeigt haben waren Axis- und Sambahirsch, Indischer Muntjak, Goldschakal, Indischer Elefant, Hanumanlangur und Wildschwein, sowie ein großes Sumpfkrokodil. Ein paar der vielen Vogel Highlights waren Doppelhornvogel, Kronenbaumsegler, Indiensegler, Spitzschwanz-Grüntaube, Kalifasan, Bankivahuhn, Schwarzstorch, Schopfwespenbussard, 3 verschiedene Geier, Binden- und Braunschwanzseeadler, Fischuhu und der wunderbare Himalajafischuhu, Blaubartspint, verschiedene bunte Spechte, Streifen- und Blauwangenbartvögel, Spateldrongo, Pflaumenkopfsittich, Elsterschnäppervanga, Menningvögel, Bengalenpirol, Weißkehl-Fächerschwanz, Graukopfschnäpper, Himalayabülbül, Samtstirn- und Zimtbauchkleiber, Grauschmätzer und der spektakuläre Karmesinnektervogel.



Nach unserer Zeit in der Ramnagar Gegend fuhren wir langsam nach Nainital, auf etwa 2000m Höhe und verbrachten hier die nächsten 3 Nächte. Während unserer Zeit hier haben wir verschiedene Gegenden besucht und in den unterschiedlichen Biotopen nach den vielen möglichen Arten gesucht. In der Pangot Gegend zum Beispiel, die höchste Stelle, die wir auf der Tour besucht haben, waren wir


auf der Suche nach verschiedenen Besonderheiten. Nach langem Suchen haben wir auf einem steilen Gras hang die erhofften Schopffasane gefunden, sonst gab es in der Gegend auch noch Schneegeier, Malaien- und Steppenadler, Rostbauch- und Himalajaspechte, Wachtezwerghauk, Strichelhäher, verschiedene Laubsänger, Weißschwanzkleiber, Himalajabraunelle und Zippammer.

Die anderen Ausflüge zu etwas tiefergelegenen Zielen haben auch spektakuläre Arten geboten: Kuckuckszwerghauk mit Fleckenscherschwanz und Bergerddrossel, Schuppengrünspecht, Himalajasittich, Borsten- und Streifenbülbühhäherlinge, Schwarzkappensibia, riesige Heulbartvogel, Tibetwürger, wunderbare Rotschnabelkitta,



Bergkohlmeise, Nepalschwalbe, Schwarzkehl-Schwanzmeise, Bänderschwanz-Baumläufer, Feenblauschnäpper, Rosenbrauengimpel, Himalajagrünfink und Rötelsperling. Während einer Mittagspause haben manche von uns einen kurzen Ausflug zum Nainitalsee gemacht und dort die ganzen Ausflugsboote und hektischen schmalen Straßen gesehen.

Unser letztes Ziel in den Bergen war die Sattal Gegend, wo wir eine Nacht verbrachten. In der Zeit hier haben wir uns wieder an ein paar wundervollen Sichtungen gefreut und haben das Auf und Ab der Vogelbeobachtungen zu dieser Jahreszeit erlebt. An einem Morgen hatten wir vor allem eine unglaubliche Stunde, wo wir zum Teil nicht wussten, wo wir zuerst hingucken sollten. Zur gleichen Zeit hatten wir Jagdelster, Weißhauben-, Rostkehl- und Weißkehlhärerlinge und Rotbauch-Blauschnäpper vor uns, in der gleichen Gegend dann auch noch Himalajakronenmeise, Grünflügel- und China-Rotschnabelbühl, Bronzedrongo, Graubrust-Baumelster, Gelbnacken- und Gelbhaubenspecht und Orientturteltaube. An einem kleinen Fluss in der Chaffi Gegend haben wir neben den bis jetzt bekannten Rotschwänzen und Kingfishern, auch 3 verschiedene Scherenschwänze und Zimtkehl schnäpper gesehen.



Nach einem letzten Morgen in der Sattal Gegend fuhren wir dann wieder in den Süden auf die Gangesebene – nach einer langen Zugfahrt kamen wir am Abend wieder in Neudelhi an. Am nächsten Morgen hatten wir etwas Zeit in Delhi und konnten diese Lücke nutzen, um den Sikhtempel und die verschiedenen und sehr beeindruckenden assoziierten Dienstleistungen, die hier angeboten werden, zu bestaunen – vor allem die riesige Küche und der Speisesaal waren sehr beeindruckend. Danach ging es noch kurz zu dem Markt am Connaught Place, vor unserer letzten Zugfahrt bis in die Nähe des Ranthambore Nationalparks, wo wir die nächsten Tage verbringen würden. Unterwegs waren aus dem Zug überraschend viele Vögel an den vielen Feuchtgebiete zu sehen.

Ranthambore Nationalpark ist aus verschiedenen Gründen für uns wichtig – nicht nur ist es die beste Chance Tiger zu finden, es hat auch viele Vogelarten und gibt uns einen Einblick in die verschiedenen trockenen Biotope in den Zonen des Parks. Über 3 Tage haben wir hier 4 Fahrten im Park gemacht und viel Zeit auf der Suche nach verschiedenen Arten verbracht –

Spuren gesucht, Alarmrufe gehört und viel Zeit mit Tieren und Vögeln gehabt. Das Highlight waren sicherlich die 5 Tiger, die wir an einem Nachmittag gesehen haben – zuerst einen den wir erst gehört und dann nach viel Suchen und Horchen sehr schön gesehen haben. Später haben wir einen weiblichen Tiger mit 3 fast ausgewachsenen Jungtieren gesehen und konnten sie lange beobachten. Auch sonst hatten wir viel Glück in diesem Park, mit guten Sichtungen von Lippenbär, Leopard, Indischer Mungo und Rotmangusten, Goldschakal, Sambar, Axishirsch, Nilgai und Indische Gazelle. Vögel in dem Nationalpark waren auch gut, auch wenn




wir manchmal unseren Fokus woanders hatten: Wollhalsstorch, Krabbentriel, Mittelreiher, Haubenschlangennadler, Kuckuckszwergkauz, Maskenraupenfänger, Pflaumenkopfsittich, Einfarb- und Rötelschwalben, Malcolmmdrosselhäherling, Braunsteinschmätzer, Gelbkehlsperrling, Wachtelfrankolin und ganz, ganz viele Pfauen. An einem Morgen sind wir nicht in den Park gefahren, sondern zu dem Soorwal See in der Nähe. Es war erstaunlich wie viele Vögel an diesem Morgen zu beobachten waren – nicht nur am Rande des Sees, sondern in und um die Gärten und Landwirtschaftsfelder, an denen wir vorbeigefahren sind. Rosenstare, eine große Gruppe Indientriels, Wendehals, Halsringtaube und Langschwanz-Drosselhäherling, Heckenkuckuck und Grauscheitellerche, waren nur ein paar der Arten hier. Am Wasser gab es auch wieder viel zu sehen, mit unseren einzigen Goldschneepfen, vielen verschiedenen anderen Limikolen, Enten und sehr schöne Silberklaffschnabel.

Als nächstes ging es auf der Tour wieder etwas in den Norden, wo wir zwei Tage in der Bharatpur Gegend hatten. Der lange Weg dahin bot uns mal die Chance mehr vom Land zu sehen und den Alltag in den Dörfern und auf dem Land wenigstens im Vorbeifahren mitzukriegen. Das Vogel-Highlight waren Indiengeier auf ihren Nestern.


Der Keoladeo Nationalpark ist für viele ein Highlight der Natur- und Vogelwelt in Indien, wir hatten einen vollen Tag und einen Nachmittag in diesem Park. Dieses Weltnaturerbe ist

dominiert von Wasservögeln, aber auch die Dornsavanne drum herum ist nicht uninteressant! Einer der dominantesten Vögel im Park sind die hunderten brütenden Buntstörche, die fantastisch zu sehen sind. Es gibt viele andere Wasservögel hier: viele der häufigen Enten waren zu sehen, aber auch ein paar, die wir nicht so oft gesehen haben, wie Koromandelzwerger, Kolbenente und Moorente. Andere Wasser-assoziierte Arten waren zum Beispiel Orient-Schlangehalsvogel, Braunwangenscharbe, Graukopf-Purpurhuhn, Weißbrust-Kielralle, Löffler, Weißschwanzkiebitz, beide Blatthühnchen und viele verschiedene Reiher, wie die Schwarzdommel, die wir leider nur kurz fliegend sahen. Der Park ist oft auch gut für Greifvögel - wir hatten auch Glück mit guten



Sichtungen von Fischadler, Schopfwespenbussard und richtig gute Schell- und Kaiseradler und Rohrweihe. Die Savanne hat auch nicht enttäuscht, mit Koromandeluhu und Brahmakauz, Rotschulterwürger, wunderbaren Wiedehopf, Weißohrbülbül, Stentorrohrsänger und verschiedene Laubsänger, Stare und Tauben. Ein weiteres Highlight war es, Indienpython und Bengalenwaran fast an der gleichen Stelle im Park zu sehen – beide sehr inaktiv beim Sonnenbad. Bei Ausflügen in der Nähe hatten wir zusätzlich auch Blaumerle, Rotflügellerche, Rosenstar, endemische Braunscheitelschwalbe, einen sehr nahen Braunwürger, schöne Saruskranich und bunte Bengalenracke. Limikolen waren hier auch ein Highlight, mit den einzigen Säbelschnäblern und Zwergstrandläufern der Tour, sowie auch Kampfläufer, Temminckstrandläufer, Dunkelwasserläufer, Bekasinen und viele andere.

Als nächstes ging es für uns in die Nähe vom Chambalfluss, wo wir noch etwas Zeit am Nachmittag hatten und ein paar neue Arten fanden: Damadrossel, Falkenkauz und Zwergschnäpper, dazu kamen schöne Brahmakauz, Indien-Zwergohreule, Indientriel und sogar noch Schwarznackenhase und Fleckenmusang. Am nächsten Morgen legten wir ein paar



Stopps auf dem Weg zum Chambalfluß ein, in der Hoffnung hier was zu finden. Wir wurden nicht enttäuscht, mit vielen Baya- und ein paar Bengalenwebern, ein wunderbares Tüpfelastrildpaar, Wendehals, Goldaugen-Grasmücke, Langschwanz-Drosselhäherling, 5 verschiedene Stare, Dschungelprinie, Bindenlaufhühnchen und viele andere. Dann hatten wir eine Bootstour auf dem Chambalfluss, der hier noch sehr sauber ist und deshalb eine der letzten guten Biotope für manche besonderen Arten bietet. Auf dieser Fahrt hatten wir den

Genuss mal vom Wasser aus zu birden, und fanden gleich am Anfang einen Gangesdelfin, der sich ein paar Mal ungewöhnlich gut, wenn trotzdem nur sehr schnell zeigte. Etwas Besonderes hier sind auch die Reptilien – wir sahen verschiedene Wasserschildkröten, sowie auch Sumpfkrokodil und die spektakulären Gaviale – die zu Beginn immer schnell weg waren, bis wir ein Tier hatten, was uns richtig nah an sich heranlies! Sirkarkuckuck wurde gut am Ufer gesehen, sowie auch Schmutzgeier, Braunliest, Graufischer, Warzenibis, Krabbentrirel, Streifengans, Mangrovereiher, Wüstensteinschmätzer und andere. Kurz bevor die Fahrt zu Ende war, war plötzlich eine große Schar Indienscherenschnabel am Fluss - sicher das größte Ziel an diesem Tag – wir konnten die Vögel wunderbar beobachten, bevor wir nach Agra weiterfuhren zu unserem letzten Stopp der Tour.



In Agra hatten wir 2 kulturelle Ziele, das Agra Fort und das Taj Mahal, die wir beide besuchten und bewundern konnten als letztes Highlight der Tour. Obwohl wir hier nicht mehr viele Vögel gesehen haben, hatten wir sehr schöne Schmutzgeier und viele Arten am Yamunafluss neben dem Taj Mahal. Nach Agra, blieb es uns nur noch nach Delhi zu fahren, da ein Abschiedsabendessen zu genießen und dann durch das Verkehrschaos zum Flugplatz zu fahren, bevor es für alle nach Hause ging. Hoffentlich mit ganz vielen besonderen Erinnerungen im Gepäck! Vielen Dank für sehr besondere und meist

angenehme Tage, in einem manchmal sehr herausfordernden Reiseland!

Artenliste

Berge: Corbett, Nainital, Pangot und Sattal Gegenden

Tiefebene: Sultanpur, Ranthambore, Keoladeo, Chambalfluß

Vögel

Javapfeifgans , *Dendrocygna javanica* , Lesser Whistling Duck

Tiefebene Feuchtgebiete

Streifengans , *Anser indicus* , Bar-headed Goose

Tiefebene Feuchtgebiete

Graugans , *Anser anser* , Greylag Goose

Tiefebene Feuchtgebiete

Glanzente , *Sarkidiornis melanotos* , Knob-billed Duck

Tiefebene Feuchtgebiete

Rostgans , *Tadorna ferruginea* , Ruddy Shelduck

Tiefebene Feuchtgebiete und am meisten in Ramnagar am Fluß

Koromandelzergente , *Nettapus coromandelianus* , Cotton Pygmy Goose

Keoldeo NP

Knäkente , *Spatula querquedula* , Garganey

Nur ein paar in Keoladeo und Umgebung

Löffelente , *Spatula clypeata* , Northern Shoveler

Tiefebene Feuchtgebiete

Schnatterente , *Mareca strepera* , Gadwall

Tiefebene Feuchtgebiete und Ramnagar

Pfeifente , *Mareca penelope* , Eurasian Wigeon

Große Tiefebene Feuchtgebiete

Indien-Fleckschnabelente , *Anas poecilorhyncha* , Indian Spot-billed Duck

Tiefebene Feuchtgebiete – endemisch

Spießente , *Anas acuta* , Northern Pintail

Tiefebene Feuchtgebiete

Krickente , *Anas crecca* , Eurasian Teal

Tiefebene Feuchtgebiete

Kolbenente , *Netta rufina* , Red-crested Pochard

Keoladeo und Umgebung. Eine in Ramnagar

Tafelente , *Aythya ferina* , Common Pochard

Tiefebene Feuchtgebiete

Moorente , *Aythya nyroca* , Ferruginous Duck

Ein oder 2 in Sultanpur und Keoladeo

Reiherente , *Aythya fuligula* , Tufted Duck

Tiefebene Feuchtgebiete

Gänsesäger , *Mergus merganser* , Common Merganser

Weibchen in Ramnagar

Hügelbuschwachtel , *Arborophila torqueola* , Hill Partridge

Ein männchen kurz im Wald bei Pangot

Koklasfasan , *Pucrasia macrolopha* , Koklass Pheasant

Auf dem Weg in der Nähe von Pangot, nur das erste Auto

Schopffasan , *Catreus wallichii* , Cheer Pheasant

Nach viel Suchen wurden 4 gut gesehen, Pangot Gegend

Kalifasan , *Lophura leucomelanos* , Kalij Pheasant

Relativ häufig in den Bergen

Pfau , *Pavo cristatus* , Indian Peafowl

Überall außer in hohen Bergen - schön im wilden zu sehen!

Bankivahuhn , *Gallus gallus* , Red Junglefowl

2 Tage in der Corbett Gegend

Wachtelfrankolin , *Ortygornis pondicerianus* , Grey Francolin

Häufig in der Tiefebene

Halsbandfrankolin , *Francolinus francolinus* , Black Francolin

2 fliegend in der Chafi Gegend

Kronenbaumsegler , *Hemiprocne coronata* , Crested Treeswift

Gut gesehen an 3 Tagen in und um Corbett NP

Indiensegler , *Zoonavena sylvatica* , White-rumped Spinetail

2 in der Nähe unsere Unterkunft bei Corbett

Haussegler , *Apus affinis* , Little Swift

An 5 Tagen auf der Tiefebene

Heckenkuckuck , *Centropus sinensis* , Greater Coucal

Oft in der Nähe von Feuchtgebieten auf der Tiefebene

Bengalenkuckuck , *Centropus bengalensis* , Lesser Coucal

Ein Vogel im langen Gras, Dhikala in Corbett NP

Sirkarkuckuck , *Taccocua leschenaultii* , Sirkeer Malkoha

3 in Sultanpur, 1 am Chambalfluß

Asienkoel , *Eudynamys scolopaceus* , Asian Koel

2 in der Nähe vom Soorwalsee, bei Ranthambhore

Wechselkuckuck , *Hierococcyx varius* , Common Hawk-Cuckoo

Einzelne in Sultanpur und Rupbas

Jakobinerkuckuck , *Clamator jacobinus* , Jacobin Cuckoo

Unerwartet – ein in Sultanpur

Bindenflughuhn , *Pterocles indicus* , Painted Sandgrouse

Ein paar als es dunkel wurde in der Nähe unsere Ranthambore Unterkunft

Felsentaube , *Columba livia* , Rock Dove

Häufig

Orientturteltaube , *Streptopelia orientalis* , Oriental Turtle Dove

In der Sattal Gegend

Türkentaube , *Streptopelia decaocto* , Eurasian Collared Dove
Häufig auf der Tiefebene

Halsringtaube , *Streptopelia tranquebarica* , Red Collared Dove
Ein Männchen Nahe Soorwal

Perlhalstaube , *Spilopelia chinensis* , Spotted Dove
Einzelne auf der Tiefebene, beste in Corbett NP

Palmtaube , *Spilopelia senegalensis* , Laughing Dove
Häufig auf der Tiefebene

Orangegrüntaube , *Treron phoenicopterus* , Yellow-footed Green Pigeon
Sehr schön auf der Tiefebene, vor allem um Delhi, Keoladeo und Chambal

Spitzschwanz-Grüntaube , *Treron apicauda* , Pin-tailed Green Pigeon
2 mal in Corbett NP

Teichhuhn , *Gallinula chloropus* , Common Moorhen
Sehr häufig: Tiefebene Feuchtgebiete

Blässhuhn , *Fulica atra* , Eurasian Coot
Hunderte in Keoladeo, auch in Sultanpur

Graukopf-Purpurhuhn , *Porphyrio poliocephalus* , Grey-headed Swampen
Viele in und um Sultanpur und in der Keoladeo Gegend

Braunbauch-Kielralle , *Zapornia akool* , Brown Crake
2 in Zone 3, Ranthambore NP

Weißbrust-Kielralle , *Amaurornis phoenicurus* , White-breasted Waterhen
Häufig bei den Feuchtgebieten auf der Tiefebene

Saruskranich , *Antigone antigone* , Sarus Crane
Sultanpur und Rupbas

Kranich , *Grus grus* , Common Crane
2 überfliegend in Sultanpur

Zwergtaucher , *Tachybaptus ruficollis* , Little Grebe
Tiefebene Feuchtgebiete

Bindenlaufhühnchen , *Turnix suscitator* , Barred Buttonquail
um Ranthambore und in der Nähe vom Chambalfluß

Indientriel , *Burhinus indicus* , Indian Stone-curlew
Unglaubliche 60 Vögel in einem Feld Nahe Soorwal, ein später bei Chambal Unterkunft

Krabbentriel , *Esacus recurvirostris* , Great Stone-curlew
Wunderbar! Ranthambore und Chambalfluß

Ibisschnabel , *Ibidorhyncha struthersii* , Ibisbill
Einer dieser Monotypischen Vögel an dem Kosifluß

Stelzenläufer , *Himantopus himantopus* , Black-winged Stilt
Tiefebene Feuchtgebiete

Säbelschnäbler , *Recurvirostra avosetta* , Pied Avocet
2 Vögel bei Rupbas

Flusskiebitz , *Vanellus duvaucelii* , River Lapwing
In der Corbett Gegend un am Chambalfluß

Gelblappenkiebitz , *Vanellus malabaricus* , Yellow-wattled Lapwing
Ein mal aus dem Zug zwischen Delhi und Ranthambore

Rotlappenkiebitz , *Vanellus indicus* , Red-wattled Lapwing
Häufig an Feuchtgebieten, außer in der hohen Bergen

Weißschwanzkiebitz , *Vanellus leucurus* , White-tailed Lapwing
Sultanpur und Keoladeo NPs

Flussregenpfeifer , *Charadrius dubius* , Little Ringed Plover
Soorwal und Chambalfluß

Seeregenpfeifer , *Charadrius alexandrinus* , Kentish Plover
Soorwal, Rupbas und Chambalfluß

Goldschnepfe , *Rostratula benghalensis* , Greater Painted-snipe
2 Männliche am Soorwalsee

Fasanenblatthühnchen , *Hydrophasianus chirurgus* , Pheasant-tailed Jacana
Sultanpur und Umgebung und Keoladeo und Umgebung

Bronzeblatthühnchen , *Metopidius indicus* , Bronze-winged Jacana
In und um Keoladeo NP

Brachvogel , *Numenius arquata* , Eurasian Curlew
1 bei Soorwal

Uferschnepfe , *Limosa limosa* , Black-tailed Godwit
Die meisten bei Soorwal, einzelne bei anderen Tiefebene Feuchtgebieten

Kampfläufer , *Calidris pugnax* , Ruff
Die meisten bei Rupbas

Temminckstrandläufer , *Calidris temminckii* , Temminck's Stint
Die meisten bei Rupbas und am Chambalfluß

Alpenstrandläufer , *Calidris alpina* , Dunlin
2 oder 3 bei dem Rupbas Feuchtgebiet

Zwergstrandläufer , *Calidris minuta* , Little Stint

Bei Rupbas

Bekassine , *Gallinago gallinago* , Common Snipe

Tiefebene Feuchtgebiete, die meisten in Rupbas

Flussuferläufer , *Actitis hypoleucos* , Common Sandpiper

In kleinen Zahlen an Feuchtgebieten in der Tiefebene

Waldwasserläufer , *Tringa ochropus* , Green Sandpiper

In kleinen Zahlen an ganz vielen Feuchtgebieten

Rotschenkel , *Tringa totanus* , Common Redshank

Die meisten in Rupbas, einzelne bei Keoladeo und am Chambalfluß

Teichwasserläufer , *Tringa stagnatilis* , Marsh Sandpiper

Ein bei Soorwal

Bruchwasserläufer , *Tringa glareola* , Wood Sandpiper

An 4 tagen bei Tiefebene Feuchtgebieten

Dunkelwasserläufer , *Tringa erythropus* , Spotted Redshank

1 in Ranthambore, etwas 40 bei Rupbas

Grünschenkel , *Tringa nebularia* , Common Greenshank

Kleine Zahlen an vielen Feuchtgebieten

Indienscherenschnabel , *Rynchops albicollis* , Indian Skimmer

Inzwischen sehr gefährdet und selten - 19 Vögel am Chambalfluß

Braunkopfmöwe , *Chroicocephalus brunnicephalus* , Brown-headed Gull

Weit weg vom Taj Mahal

Lachmöwe , *Chroicocephalus ridibundus* , Black-headed Gull

Weit weg am Yamunafluß bei Taj Mahal

Fischmöwe , *Ichthyophaga ichthyophaga* , Pallas's Gull

1 bei Bund Baretha, 2 beim Chambalfluß

Goldschnabel-Seeschwalbe , *Sterna aurantia* , River Tern

An vielen Tiefebene Feuchtgebieten

Schwarzbauch-Seeschwalbe , *Sterna acuticauda* , Black-bellied Tern

Ein kurz am Chambalfluß gesehen

Buntstorch , *Mycteria leucocephala* , Painted Stork

Hunderte in Sultanpur und Keoladeo

Silberklaffschnabel , *Anastomus oscitans* , Asian Openbill

Mehrere an Feuchtgebieten in der letzten Woche, brütend bei Keoladeo NP

Schwarzstorch , *Ciconia nigra* , Black Stork

An 2 Tagen: in Corbett und Ranthambore NPs

Wollhalsstorch , *Ciconia episcopus* , Asian Woolly-necked Stork

1 in Corbett und viele auf der Tiefebene

Riesenstorch , *Ephippiorhynchus asiaticus* , Black-necked Stork

Einzelne Vögel in Sultanpur, Corbett und in Keoladeo NPs

Orient-Schlangehalsvogel , *Anhinga melanogaster* , Oriental Darter

Häufig bei Tiefebene Feuchtgebieten

Kleinscharbe , *Microcarbo niger* , Little Cormorant

Tiefebene Feuchtgebiete

Braunwangenscharbe , *Phalacrocorax fuscicollis* , Indian Cormorant

Viele in Sultanpur und Keoladeo

Kormoran , *Phalacrocorax carbo* , Great Cormorant

Häufig bei Tiefebene Feuchtgebieten, auch bei Ramnagar

Schwarzkopfbis , *Threskiornis melanocephalus* , Black-headed Ibis

Kleine Zahlen bei Tiefebene Feuchtgebieten

Warzenibis , *Pseudibis papillosa* , Red-naped Ibis

Bei Sultanpur und am Chambalfluß

Sichler , *Plegadis falcinellus* , Glossy Ibis

Tiefebene Feuchtgebiete

Löffler , *Platalea leucorodia* , Eurasian Spoonbill

In und um Keoladeo NP, inklusive brütende Vögel

Schwarzdommel , *Ixobrychus flavicollis* , Black Bittern

1 kurz fliegend in Keoladeo NP

Nachtreiher , *Nycticorax nycticorax* , Black-crowned Night Heron

In und um Ranthambore und Keoladeo

Mangrovereiher , *Butorides striata* , Striated Heron

Ein paar in Keoladeo und am Chambalfluß

Paddyreiher , *Ardeola grayii* , Indian Pond Heron

Tiefebene Feuchtgebiete

Koromandelkuhreiher , *Bubulcus coromandus* , Eastern Cattle Egret

Tiefebene Feuchtgebiete

Graureiher , *Ardea cinerea* , Grey Heron

Tiefebene Feuchtgebiete

Purpureiher , *Ardea purpurea* , Purple Heron

Tiefebene Feuchtgebiete

Silberreiher , *Ardea alba* , Great Egret

Tiefebene Feuchtgebiete

Mittelreiher , *Ardea intermedia* , Intermediate Egret

Tiefebene Feuchtgebiete, etwas seltener, beste in Keoladeo NP

Seidenreiher , *Egretta garzetta* , Little Egret

Tiefebene Feuchtgebiete und am Kosifluß

Fischadler , *Pandion haliaetus* , Osprey

Sultanpur, Keoladeo und sehr gut am Chambalfluß

Gleitaar , *Elanus caeruleus* , Black-winged Kite

Häufig in der Tiefebene

Schmutzgeier , *Neophron percnopterus* , Egyptian Vulture

Gut am Chambalfluß und der Umgebung und am Taj Mahal

Schopfwespenbussard , *Pernis ptilorhynchus* , Crested Honey Buzzard

An 6 Tagen in verschiedene Gegenden, immer fliegend

Indiengeier , *Gyps indicus* , Indian Vulture

Ruhend an Felsen vor Bharatpur und fliegend auch bei Ranthambore

Schneegeier , *Gyps himalayensis* , Himalayan Vulture

Corbett und Nainital Umgebung, vor allem jungen Vögel

Kahlkopfgeier , *Sarcogyps calvus* , Red-headed Vulture

2 einzelne Vögel in Corbett NP

Mönchsgeier , *Aegypius monachus* , Cinereous Vulture

Sitzend in Corbett NP und fliegend auf der Fahrt nach Nainital

Haubenschlangenadler , *Spilornis cheela* , Crested Serpent Eagle

Wunderbar sitzend in Ranthambore und vorher am Kosifluß

Indienhaubenadler , *Nisaetus cirrhatus* , Changeable Hawk-Eagle

An 2 Tagen um Corbett NP

Berghaubenadler , *Nisaetus nipalensis* , Mountain Hawk-Eagle

Weit weg in der Nainital Region

Malaienadler , *Ictinaetus malaiensis* , Black Eagle

Ein bei Pangot und ein unerwartet bei Ranthambore

Gangesadler , *Clanga hastata* , Indian Spotted Eagle

Ein in Sultanpur

Schelladler , *Clanga clanga* , Greater Spotted Eagle
Schön gesehen in Keoladeo NP, auch Sultanpur

Zwergadler , *Hieraaetus pennatus* , Booted Eagle
In Sultanpur NP und bei Rupbas

Steppenadler , *Aquila nipalensis* , Steppe Eagle
Fast Täglich in kleinen Zahlen in den Bergen

Kaiseradler , *Aquila heliaca* , Eastern Imperial Eagle
Ein sehr gut gesehen in Keoladeo NP

Schikrasperber , *Accipiter badius* , Shikra
Häufig auf der Tiefebene

Sperber , *Accipiter nisus* , Eurasian Sparrowhawk
Ein gut gesehen beim Chambalfluß

Rohrweihe , *Circus aeruginosus* , Western Marsh Harrier
Mehrere in Sultanpur und Keoladeo NP

Schwarzmilan , *Milvus migrans* , Black Kite
Häufig, vor allem um Städte

Bindenseeadler , *Haliaeetus leucoryphus* , Pallas's Fish Eagle
Zwei Vögel sehr schön gesehen bei Dhikala und am Kosifluß

Braunschwan-Seeadler , *Haliaeetus humilis* , Lesser Fish Eagle
Ein sehr schön am Kosifluß

Tibetbussard , *Buteo relictus* , Himalayan Buzzard
Ein am Chambalfluß gesehen

Adlerbussard , *Buteo rufinus* , Long-legged Buzzard
Ein sehr gut fliegend in Sultanpur NP

Falkenkauz , *Ninox scutulata* , Brown Boobook
1 im Garten unsere Chambal Unterkunft

Wachtelzwergkauz , *Taeniopteryx brodiei* , Collared Owlet
Eine winzige Eule in der Nähe von Nainital

Brahmakauz , *Athene brama* , Spotted Owlet
An 4 Tagen: Sultanpur, Ranthambore und Keoladeo

Kuckuckszwergkauz , *Glaucidium cuculoides* , Asian Barred Owlet
Fantastisch bei Nainital gesehen, auch in Sattal

Dschungelzwergkauz , *Glaucidium radiatum* , Jungle Owlet
Von manchen in Corbett NP gesehen

Indien-Zwergohreule , *Otus bakkamoena* , Indian Scops Owl

Gut versteckte Individuen wurden in Sultanpur, Ranthambore und Chambal gesehen

Fischuhu , *Ketupa zeylonensis* , Brown Fish Owl

Ein beim Kosifluß

Himalajafischuhu , *Ketupa flavipes* , Tawny Fish Owl

Ein kurz in Corbett, dann im Spektiv beim Kosifluß

Koromandeluhu , *Ketupa coromanda* , Dusky Eagle-Owl

Ein auf dem Nest in Keoladeo, 2 in Ranthambore

Wiedehopf , *Upupa epops* , Eurasian Hoopoe

Ziemlich häufig auf der Tiefebene und in Corbett NP

Doppelhornvogel , *Buceros bicornis* , Great Hornbill

Fantastisch gesehen, Corbett NP

Orienthornvogel , *Anthracoceros albirostris* , Oriental Pied Hornbill

2 schlecht gesehen, Corbett NP

Indienhornvogel , *Ocyrceros birostris* , Indian Grey Hornbill

In kleinen Zahlen, verschiedenen Tiefebene Parks

Bengalenracke , *Coracias benghalensis* , Indian Roller

Einzelne Vögel auf der Tiefebene, ein gut bei Rupbas

Braunliet , *Halcyon smyrnensis* , White-throated Kingfisher

Sehr häufig und gern gesehen

Eisvogel , *Alcedo atthis* , Common Kingfisher

An den meisten Tagen gesehen

Haubenfischer , *Megaceryle lugubris* , Crested Kingfisher

Großer Fischer – am Kosifluß gut gesehen

Graufischer , *Ceryle rudis* , Pied Kingfisher

Öffter bei Tiefebene Feuchtgebieten und Corbett Gegend

Blaubartspint , *Nyctyornis athertoni* , Blue-bearded Bee-eater

An 3 Tagen in Corbett NP

Bronzescheitel-Smaragdspint , *Merops orientalis* , Asian Green Bee-eater

Am ersten Tag in Sultanpur, einzelne in den letzten Tagen

Heulbartvogel , *Psilopogon virens* , Great Barbet

In Nainital und Sattal gesehen – sehr viel gehört

Braunkopf-Bartvogel , *Psilopogon zeylanicus* , Brown-headed Barbet

Einzelne in Keoladeo und Chambal gesehen

Streifenbartvogel , *Psilopogon lineatus* , Lineated Barbet

Sehr gut in und um Corbett NP gesehen

Blauwangen-Bartvogel , *Psilopogon asiaticus* , Blue-throated Barbet

Ein Vogel in Corebtt NP

Kupferschmied-Bartvogel , *Psilopogon haemacephalus* , Coppersmith Barbet

Einzelne Vögel bei Ranthambore, Keoladeo und Chambal

Wendehals , *Jynx torquilla* , Eurasian Wryneck

Gute gesehen an verschiedenen Orten auf der Tiefebene

Indienspecht , *Yungipicus nanus* , Brown-capped Pygmy Woodpecker

Ein in der Nähe vom Kosifluß

Grauscheitelspecht , *Yungipicus canicapillus* , Grey-capped Pygmy Woodpecker

In der Nähe von unsere Unterkunft am Kosifluß gesehen

Braunstirnspecht , *Dendrocoptes auriceps* , Brown-fronted Woodpecker

Mehrmals in Nainital und Sattal

Rostbauchspecht , *Dendrocopos hyperythrus* , Rufous-bellied Woodpecker

Fantastisch gesehen über Nainital

Isabellbrustspecht , *Dendrocopos macei* , Fulvous-breasted Woodpecker

An 2 Tagen in der Corbett Gegend

Himalajaspecht , *Dendrocopos himalayensis* , Himalayan Woodpecker

2 in der Pangot Gegend

Gelbnackenspecht , *Chrysophlegma flavinucha* , Greater Yellownape

Gut gesehen in Corbett, bei Nainital und Sattal

Gelbhaubenspecht , *Picus chlorolophus* , Lesser Yellownape

An 3 Tagen in den Bergen gesehen

Indiengrünspecht , *Picus xanthopygaeus* , Streak-throated Woodpecker

Ein paar in Corbett

Schuppengrünspecht , *Picus squamatus* , Scaly-bellied Woodpecker

Ein besondere: gut bei Bajoon

Grauspecht , *Picus canus* , Grey-headed Woodpecker

4 in der Sattal Gegend

Himalaja-Feuerrückenspecht , *Dinopium shorii* , Himalayan Flameback

Gut in und um Corbett NP gesehen

Bengalenspecht , *Dinopium benghalense* , Black-rumped Flameback

Vielleicht am ersten Tag bei Sultanpur am besten gesehen

Goldmantel-Sultanspecht , *Chrysocolaptes guttacristatus* , Greater Flameback
3 kurz bei Dhikala in Corbett gesehen

Turmfalke , *Falco tinnunculus* , Common Kestrel
3 aus dem Zug nach Ranthambore gesehen, auch bei Keoladeo

Laggarfalke , *Falco jugger* , Laggar Falcon
Ein fliegend über Keoladeo NP

Wanderfalke , *Falco peregrinus* , Peregrine Falcon
Ein fliegend bei Bajoon gesehen

Himalajasittich , *Psittacula himalayana* , Slaty-headed Parakeet
An mehreren Tagen um Nainital und Sattal gesehen

Pflaumenkopfsittich , *Psittacula cyanocephala* , Plum-headed Parakeet
Schöne gesehen in Corbett NP und um Ranthambore

Alexandersittich , *Psittacula eupatria* , Alexandrine Parakeet
Einzelne in Sultanpur und Ranthambore

Halsbandsittich , *Psittacula krameri* , Rose-ringed Parakeet
Häufig auf der Tiefebene

Elsterschnäppervanga , *Hemipus picatus* , Bar-winged Flycatcher-shrike
Häufig in gemischten Scharen in Corbett Gegend

Indienvanga , *Tephrodornis pondicerianus* , Common Woodshrike
Ein Vogel bei Ranthambore Unterkunft

Zwergmennigvogel , *Pericrocotus cinnamomeus* , Small Minivet
Gut gesehen in Sultanpur und dann in Ranthambore

Langschwanz-Mennigvogel , *Pericrocotus ethologus* , Long-tailed Minivet
In Corbett gesehen

Scharlachmennigvogel , *Pericrocotus speciosus* , Scarlet Minivet
In Corbett und gut in Sattal gesehen

Maskenraupenfänger , *Coracina macei* , Large Cuckooshrike
Ein in Corbett und 2 in Zone 3 in Ranthambore

Braunwürger , *Lanius cristatus* , Brown Shrike
Ein männliche bei Rupbas

Rotschulterwürger , *Lanius vittatus* , Bay-backed Shrike
Ein paar gesehen bei Ranthambore und in und um Keoladeo

Schachwürger , *Lanius schach* , Long-tailed Shrike
Häufig gesehen in der Tiefebene und in Corbett NP

Tibetwürger , *Lanius tephronotus* , Grey-backed Shrike
Ein Jungvogel bei Bajoon

Bengalenpirol , *Oriolus xanthornus* , Black-hooded Oriole
Ein Vogel gut gesehen in Corbett NP

Bronzedrongo , *Dicrurus aeneus* , Bronzed Drongo
Gut gesehen in Sattal

Spateldrongo , *Dicrurus remifer* , Lesser Racket-tailed Drongo
Sehr gut gesehen in Dhikala, Corbett NP

Haarbuschdrongo , *Dicrurus hottentottus* , Hair-crested Drongo
Ein Vogel früh in Corbett NP

Graudrongo , *Dicrurus leucophaeus* , Ashy Drongo
Gut in Sattal gesehen

Graubrustdrongo , *Dicrurus caerulescens* , White-bellied Drongo
Mehrere in Ranthambore

Königsdrongo , *Dicrurus macrocercus* , Black Drongo
Jeden Tag auf der Tiefebene

Weißkehl-Fächerschwanz , *Rhipidura albicollis* , White-throated Fantail
Fast täglich in den Bergen

Weißstirn-Fächerschwanz , *Rhipidura aureola* , White-browed Fantail
In Ranthambore NP

Eichelhäher , *Garrulus glandarius* , Eurasian Jay
In der Nainital/ Pangot Gegend

Strichelhäher , *Garrulus lanceolatus* , Black-headed Jay
Sehr schön gesehen in der Nainital Gegend

Rotschnabelkitta , *Urocissa erythroryncha* , Red-billed Blue Magpie
Mehrere sehr schön gesehen in den verschiedenen Orte in den Bergen

Jagdelster , *Cissa chinensis* , Common Green Magpie
Schön gesehen, in Corbett und Sattal Gegenden

Wanderbaumelster , *Dendrocitta vagabunda* , Rufous Treepie
Fast überall gesehen außer in den hohen Bergen

Graubrust-Baumelster , *Dendrocitta formosae* , Grey Treepie
An 3 Tagen in den tieferen Bergen gesehen

Glanzkrähe , *Corvus splendens* , House Crow
Täglich auf der Tiefebene, außer bei Ranthambore

Dschungelkrähe , *Corvus macrorhynchos* , Large-billed Crow
Um Nainital und Sattal

Indien-Dschungelkrähe , *Corvus culminatus* , Indian Jungle Crow
Um Corbett NP und der Tiefebene gesehen

Goldbauch-Fächerschnäpper , *Chelidorhynch hypoxanthus* , Yellow-bellied Fantail
Ein paar hektische Vögel in der Corbett Gegend

Graukopfschnäpper , *Culicicapa ceylonensis* , Grey-headed Canary-flycatcher
Einzelne Vögel an verschiedenen Tagen: Sultanpur, Corbett und vor der zweiten Zugfahrt

Laubmeise , *Sylviparus modestus* , Yellow-browed Tit
Einzelne zwei mal in Nainital Gegend

Tannenmeise , *Periparus ater* , Coal Tit
Mehrere mal um Nainital gesehen

Graukohlmeise , *Parus cinereus* , Cinereous Tit
Vor allem in der Corbett Gegend, auch Sattal und Ranthambore

Bergkohlmeise , *Parus monticolus* , Green-backed Tit
Gut gesehen um Nainital und Sattal

Himalajakronenmeise , *Machlolophus xanthogenys* , Himalayan Black-lored Tit
Wunderbare Vogel – Nainital und Sattal Gegend

Grauscheitellerche , *Eremopterix griseus* , Ashy-crowned Sparrow-Lark
Ein Duzend in der Soorwalsee Gegend

Rotflügellerche , *Mirafra erythroptera* , Indian Bush Lark
2 in der Nähe von Bund Baretha

Orientfeldlerche , *Alauda gulgula* , Oriental Skylark
Am ersten Tag gehört

Uferlerche , *Alaudala raytal* , Sand Lark
Manche haben 2 am Chambalfluß gesehen

Grünflügelbülbul , *Ixos mccllellandii* , Mountain Bulbul
In Sattal gesehen

China-Rotschnabelbülbul , *Hypsipetes leucocephalus* , Black Bulbul
In Bajoron und Sattal gesehen

Rotohrbülbul , *Pycnonotus jocosus* , Red-whiskered Bulbul
Sultanpur und Corbett Gegend

Rotsteißbülbul , *Pycnonotus cafer* , Red-vented Bulbul
Eine der wenig Arten die fast jeden Tag gesehen wurde

Weißohrbülbül , *Pycnonotus leucotis* , White-eared Bulbul
In der Keoladeo Gegend

Himalajabülbül , *Pycnonotus leucogenys* , Himalayan Bulbul
Der Punker, jeden Tag in den Bergen

Graukehl-Uferschwalbe , *Riparia chinensis* , Grey-throated Martin
Oft um verschiedene Feuchtgebiete gesehen

Felsenschwalbe , *Ptyonoprogne rupestris* , Eurasian Crag Martin
Eine bei Pangot

Einfarbschwalbe , *Ptyonoprogne concolor* , Dusky Crag Martin
Täglich um Ranthambore gesehen

Rotkappenschwalbe , *Hirundo smithii* , Wire-tailed Swallow
Ziemlich oft auf der Tiefebene

Rauchschwalbe , *Hirundo rustica* , Barn Swallow
An 8 Tagen, sehr unterschiedlichen Orten

Nepalschwalbe , *Delichon nipalense* , Nepal House Martin
Gut in der Bajoon Gegend

Rötelschwalbe , *Cecropis daurica* , Red-rumped Swallow
Vor allem um Ranthambore, auch Corbett und Chambal

Braunscheitelschwalbe , *Petrochelidon fluvicola* , Streak-throated Swallow
Viele und gut in Rupbas und am Chambalfluß

Schieferkopf-Dickichtsänger , *Abroscopus schisticeps* , Black-faced Warbler
Hektische Vögel bei Bajoon

Schwarzkehl-Schwanzmeise , *Aegithalos concinnus* , Black-throated Bushtit
Vielen in den Bergen – vor allem Nainital und Sattal

Goldbinden-Laubsänger , *Phylloscopus pulcher* , Buff-barred Warbler
Ein paar in der Nainital Gegend

Tienschan-Laubsänger , *Phylloscopus humei* , Hume's Leaf Warbler
Ein gut in Sultanpur. Warscheinlich auch andere auf der Tiefebene

Gelbbürzel-Laubsänger , *Phylloscopus chloronotus* , Lemon-rumped Warbler
Gut gesehen in den höheren Bergen

Zilpzalp , *Phylloscopus collybita* , Common Chiffchaff
Die meisten um Keoladeo, einzelne um Nainital und Sultanpur

Whistlerlaubsänger , *Phylloscopus whistleri* , Whistler's Warbler
Ein kurz in Keoladeo

Graukopf-Laubsänger , *Phylloscopus xanthoschistos* , Grey-hooded Warbler
Häufig in gemischten Scharen in den Bergen

Stentorrohrsänger , *Acrocephalus stentoreus* , Clamorous Reed Warbler
3 Vögel in Keoladeo

Buschrohrsänger , *Acrocephalus dumetorum* , Blyth's Reed Warbler
Ein paar Vögel um Keoladeo

Zistensänger , *Cisticola juncidis* , Zitting Cisticola
Mehrere in Corbett NP, auch gut vor Sultanpur

Bergprinie , *Prinia crinigera* , Himalayan Prinia
Zwei oder drei mal auf dem Weg nach Nainital

Roststirnprinie , *Prinia buchanani* , Rufous-fronted Prinia
Ein Vogel gut gesehen bei unsere Ranthambore Unterkunft

Graubrustprinie , *Prinia hodgsonii* , Grey-breasted Prinia
An 4 Tagen in den Bergen gesehen – sehr schnelle Vögel

Dschungelprinie , *Prinia sylvatica* , Jungle Prinia
Bei Ranthambore und Chambal gesehen

Rostbauchprinie , *Prinia socialis* , Ashy Prinia
Eine häufige Prinie in der Tiefebene und Corbett Gegend

Schlichtprinie , *Prinia inornata* , Plain Prinia
Häufig in Sultanpur, Keoladeo und Chambal

Rotstirn-Schneidervogel , *Orthotomus sutorius* , Common Tailorbird
Einzelne Vögel in Sultanpur und Corbett

Klappergrasmücke , *Curruca curruca* , Lesser Whitethroat
Mehrere einzelne Vögel auf der Tiefebene

Nachtigallengrasmücke , *Curruca crassirostris* , Eastern Orphean Warbler
Ein oder zwei auf dem Weg zwischen Ranthambore und Keoladeo

Goldaugen-Grasmücke , *Chrysomma sinense* , Yellow-eyed Babbler
Ein paar Vogel bei Soorwal und beim Chambalfluß

Gangesbrillenvogel , *Zosterops palpebrosus* , Indian White-eye
Häufig gesehen, verschiedene Orte

Schwarzkinn-Buschtimalie , *Cyanoderma pyrrhops* , Black-chinned Babbler
Gut in der Sattal Gegend

Rotwangensäbler , *Erythrogonys erythrogonys* , Rusty-cheeked Scimitar Babbler
2 trinkend in der Sattal Gegend

Streifenbülbühläherling , *Grammatoptila striata* , Striated Laughingthrush
Sehr schön in der Bajaan und Sattal Gegend gesehen

Borstenhäherling , *Trochalopteron lineatum* , Streaked Laughingthrush
Oft in der Höheren bergen gesehen

Rotscheitelhäherling , *Trochalopteron erythrocephalum* , Chestnut-crowned Laughingthrush
Scheue Vogel – Bajaan und Sattal schlecht gesehen

Schwarzkappensibia , *Heterophasia capistrata* , Rufous Sibia
Gut gesehen in der Nainital und Sattal Gegend

Blaulügelsiva , *Actinodura cyanoptera* , Blue-winged Minla
Gut beim trinken in Sattal gesehen

Rotschnabel-Sonnenvogel , *Leiothrix lutea* , Red-billed Leiothrix
Scheu und schnell im Dickicht um Sattal

Malcolmdrosselhäherling , *Argya malcolmi* , Large Grey Babbler
Oft in den trockenen Gegenden der Tiefebene gesehen

Dschungeldrosselhäherling , *Argya striata* , Jungle Babbler
Fast täglich gesehen

Langschwanz-Drosselhäherling , *Argya caudata* , Common Babbler
Ein paar Sichtungen in trockenen Gegenden in der letzten Woche

Weißhaubenhäherling , *Garrulax leucolophus* , White-crested Laughingthrush
Spektakuläre Vogel – gut in Sattal gesehen

Rostkinnhäherling , *Lanthocincla rufogularis* , Rufous-chinned Laughingthrush
Ein paar schön beim putzen gesehen in der Sattal Gegend

Weißkehlhäherling , *Pterorhinus albobularis* , White-throated Laughingthrush
Normal in großen Gruppen – ein paar mal in den Bergen

Samtstirnkleiber , *Sitta frontalis* , Velvet-fronted Nuthatch
Schön gesehen in Corbett und Sattal Gegenden

Weißschwanzkleiber , *Sitta himalayensis* , White-tailed Nuthatch
Öfters, hoch um Nainital

Zimtbauchkleiber , *Sitta cinnamoventris* , Chestnut-bellied Nuthatch
In gemischten Scharen in Corbett und Sattal Gegenden

Mauerläufer , *Tichodroma muraria* , Wallcreeper
Ein wurde sehr gut gesehen am Kosifluß, wo er in Flußsteinen aktiv war

Bänderschwanz-Baumläufer , *Certhia himalayana* , Bar-tailed Treecreeper
Ziemlich häufig in der Nainital und Sattal Gegend

Ufermaina , *Acridotheres ginginianus* , Bank Myna
Häufig in den meisten Tiefebene Orten

Hirtenmaina , *Acridotheres tristis* , Common Myna
An jedem Tag außen in den hohen Bergen gesehen

Elsterstar , *Gracupica contra* , Indian Pied Myna
Täglich auf der Tiefebene

Pagodenstar , *Sturnia pagodarum* , Brahminy Starling
Fast Täglich auf der Tiefebene, viele in Keoladeo

Rosenstar , *Pastor roseus* , Rosy Starling
An 3 tagen gesehen, Soorwal, Bund Baretha und Chambal

Star , *Sturnus vulgaris* , Common Starling
Etwa 6 Vögel früh am ersten Tag, nahe Sultanpur

Bergerddrossel , *Zoothera monticola* , Long-billed Thrush
Ein sehr gut gesehen in Bajoon

Damadrossel , *Geokichla citrina* , Orange-headed Thrush
Ein Vogel bei unsere Chambal Unterkunft

Strauchschmätzer , *Copsychus fulicatus* , Indian Robin
Schöne Endemit, häufig auf der Tiefebene und bei Corbett

Dajalschama , *Copsychus saularis* , Oriental Magpie-Robin
Ziemlich häufig auf der Tiefebene und bei Corbett

Weißbürzelschama , *Copsychus malabaricus* , White-rumped Shama
Ein wurde sehr kurz in Corbett gesehen

Tickellblauschnäpper , *Cyornis tickelliae* , Tickell's Blue Flycatcher
Mindestens eine war bei unsere Unterkunft am Kosifluß

Rotbauch-Blauschnäpper , *Niltava sundara* , Rufous-bellied Niltava
Einer in der Kosifluß Gegend, ein andere bei Sattal

Feenblauschnäpper , *Niltava macgrigoriae* , Small Niltava
Ein wurde gut gesehen von eine Bajoontal Brücke

Blaukehlchen , *Luscinia svecica* , Bluethroat
Mehrere wurden an Feuchtgebieten auf der Tiefebene gesehen

Himalajablauschwanz , *Tarsiger rufilatus* , Himalayan Bluetail
2 beim trinken in Sattal

Stummelscherenschwanz , *Enicurus scouleri* , Little Forktail
Ein am Fluß in der Sattal Gegend gesehen

Graurücken-Scherenschwanz , *Enicurus schistaceus* , Slaty-backed Forktail
2 bei Nainital und ein bei Sattal gesehen

Fleckenscherenschwanz , *Enicurus maculatus* , Spotted Forktail
Spektakuläre Vogel, an drei Tagen gut gesehen in der Nainital Region

Purpurpfeifdrossel , *Myophonus caeruleus* , Blue Whistling Thrush
Häufig in den Bergen - hübsch und groß

Zimtkehlschnäpper , *Ficedula strophilata* , Rufous-gorgeted Flycatcher
An beiden Tagen in der Sattal Gegend gesehen

Dreifarbenschnäpper , *Ficedula tricolor* , Slaty-blue Flycatcher
Gut aber schnell bei Sattal gesehen

Taigaschnäpper , *Ficedula albicilla* , Taiga Flycatcher
Ein in Ranthambore gesehen

Zwergschnäpper , *Ficedula parva* , Red-breasted Flycatcher
Ein im Garten bei der Chambal Unterkunft

Blaukopf-Rotschwanz , *Phoenicurus coerulescapus* , Blue-capped Redstart
Ein paar auf dem Weg nach Nainital, 2 Männchen bei Sattal

Hausrotschwanz , *Phoenicurus ochruros* , Black Redstart
In Sultanpur, Corbett und die Keoladeo Gegend

Wasserrotschwanz , *Phoenicurus fuliginosus* , Plumbeous Water Redstart
Sehr oft an den meisten Flüssen in den Bergen

Weißscheitel-Rotschwanz , *Phoenicurus leucocephalus* , White-capped Redstart
Wie die vorige Art, sehr oft an den Bergflüssen

Blaumerle , *Monticola solitarius* , Blue Rock Thrush
Ein Vogel in der Nähe von Bund Baretha

Pallassschwarzkehlchen , *Saxicola maurus* , Siberian Stonechat
In Graslandschaften in Corbett, Sultanpur, um Ranthambore und Chambal

Elsterschmätzer , *Saxicola caprata* , Pied Bush Chat
In vielen Graslandschaften, Täglich um Keoladeo und Chambal

Grauschmätzer , *Saxicola ferreus* , Grey Bush Chat
Häufig in den Bergen, nur nicht höher als Nainital

Wüstensteinschmätzer , *Oenanthe deserti* , Desert Wheatear
2 Vögel am Chambalfluß

Braunsteinschmätzer , *Oenanthe fusca* , Brown Rock Chat
Ein Endemit – an den meisten Tagen auf der Tiefebene und um Corbett

Elstersteinschmätzer , *Oenanthe picata* , Variable Wheatear
Ein Weibchen nördlich von Ranthambore

Blassschnabel-Mistelfresser , *Dicaeum erythrorhynchos* , Pale-billed Flowerpecker
Ein Vogel bei unsere Unterkunft bei Corbett NP

Purpurenektarvogel , *Cinnyris asiaticus* , Purple Sunbird
Einzelne Vögel in Schlichtkleid auf der Tiefebene

Grünschwanz-Nektarvogel , *Aethopyga nipalensis* , Green-tailed Sunbird
An drei Tagen in den Bergen gesehen, immer hektisch und schnell weg

Karmesinnektarvogel , *Aethopyga siparaja* , Crimson Sunbird
Es gab mehrere im Garten von unserer Corbett Unterkunft

Gelbkehlsperling , *Gymnoris xanthocollis* , Yellow-throated Sparrow
An 2 Tagen in der Ranthambore Gegend gesehen

Rötelsperling , *Passer cinnamomeus* , Russet Sparrow
In höheren Lagen, vor allem um Nainital gesehen

Hausperling , *Passer domesticus* , House Sparrow
An mehr als die Hälfte der Tage gesehen, viele Orte

Bengalenweber , *Ploceus benghalensis* , Black-breasted Weaver
Mindestens 2 Vögel in eine großen Bayaweber Schar beim Chambalfluß

Bayaweber , *Ploceus philippinus* , Baya Weaver
Ein paar große Gruppe in der Nähe vom Chambalfluß, einzelne vorher

Indiensilberschnabel , *Euodice malabarica* , Indian Silverbill
An vielen Tagen auf der Tiefebene gesehen, meist auf großen Gräsern

Muskatbronzemännchen , *Lonchura punctulata* , Scaly-breasted Munia
Um Sultanpur und unter Pango gesehen

Tüpfelastrid , *Amandava amandava* , Red Avadavat
Ein paar wurde wunderbar beim Chambalfluß gesehen

Himalajabraunelle , *Prunella himalayana* , Altai Accentor
Ein sehr gut bei Pangot gesehen

Strichelbraunelle , *Prunella strophiatea* , Rufous-breasted Accentor
2 gerade unterhalb Nainital mit anderen Saatsfressern gesehen

Schafstelze , *Motacilla flava* , Western Yellow Wagtail
Die meisten am ersten Morgen, auch am Kosifluß und Chambalfluß

Zitronenstelze , *Motacilla citreola* , Citrine Wagtail
An 4 Tagen bei Tiefebene Feuchtgebieten gesehen

Gebirgsstelze , *Motacilla cinerea* , Grey Wagtail

An 7 Tagen an verschiedenen feuchtgebieten, auch Sattal, Ranthambore und Keoladeo

Bachstelze , *Motacilla alba* , White Wagtail

Häufig auf der Tiefebene und Corbett Gegend

Weißbrauenstelze , *Motacilla maderaspatensis* , White-browed Wagtail

Die meisten am Chambalfluß, vorher am Kosifluß und Ranthambore

Orientspornpieper , *Anthus rufulus* , Paddyfield Pipit

An 3 Tagen in kurzem Gras gesehen

Brachpieper , *Anthus campestris* , Tawny Pipit

Ein in der Ranthambore Gegend, meist in trockenen Gebieten

Langschnabelpieper , *Anthus similis* , Long-billed Pipit

Gut gesehen in Corbett und bei Bund Baretha

Baumpieper , *Anthus trivialis* , Tree Pipit

Soorwalsee und Chambalfluß

Rosenpieper , *Anthus roseatus* , Rosy Pipit

Ein wurde gut vor Sultanpur gesehen

Karmingimpel , *Carpodacus erythrinus* , Common Rosefinch

Bei Nainital und Sattal an 2 Tagen gesehen, die meisten Weiblich

Rosenbrauengimpel , *Carpodacus rodochroa* , Pink-browed Rosefinch

Ein wunderbares Männchen in der Nähe von Nainital mit anderen kleinen Vögeln

Himalajagrünfink , *Chloris spinoides* , Yellow-breasted Greenfinch

An 2 Tagen um Nainital und Sattal gesehen

Zippammer , *Emberiza cia* , Rock Bunting

An einem Morgen bei Pangot gut gesehen

Braunkopffammer , *Emberiza bruniceps* , Red-headed Bunting

Ein Vogel 2 mal in der Ranthambore Gegend auf großem Gras gesehen

Hier ist ein Link zu den Listen, die ich auf eBird hochgeladen habe – manche haben einzelne Arten, die abweichen von dem, was alle gesehen haben.

<https://ebird.org/tripreport/284539>

Säugetiere

Indischer Riesenflughund , *Pteropus giganteus* , Indian Flying Fox

Oft auf der Tiefebene, gut in Keoladeo und bei Ranthambore

Nacktbauch-Grabfledermaus , *Taphozous nudiventris* , Naked-rumped Tomb-Bat

Im Agra fort gesehen

Rhesusaffe , *Macaca mulatta* , Rhesus Macaque

Täglich

Bengalische Hanumanlangur , *Semnopithecus entellus* , Northern Plains Grey Langur

Um Corbett und Ranthambore NPs

Nepalesischer Hanumanlangur , *Semnopithecus schistaceus* , Himalayan Grey Langur

Gut gesehen in hohen Lagen um Nainital

Schwarznackenhase , *Lepus nigricollis* , Indian Hare

2 bei der Chambal Unterkunft

Nördliches Palmenhörnchen , *Funambulus pennantii* , Northern Palm Squirrel

Häufig: Tiefebene und Corbett

Wanderratte , *Rattus norvegicus* , Brown Rat

Mehrere beim Old Delhi Bahnhof

Hausmaus , *Mus domesticus* , House Mouse?

Vielleicht diese Art in der Keoladeo Gegend

Buntmarder , *Martes flavigula* , Yellow-throated Marten

Ein schnell in Corbett und sehr gut in der Pangot Gegend

Kleiner Mungo , *Herpestes javanicus* , Small Indian Mongoose

Eine am ersten Morgen, ein andere für manche beim Chambalfluß

Indischer Mungo , *Urva edwardsi* , Indian Grey Mongoose

Sehr gut an 2 Tagen in Ranthambore gesehen

Indische Rotmanguste , *Urva smithii* , Ruddy Mongoose

Ein schnell am Rande von Ranthambore

Fleckenmusang , *Paradoxurus hermaphroditus* , Asian Palm Civet

Eine wurde am Abend bei unsere Chambal Unterkunft gesehen

Goldschakal , *Canis aureus* , Golden Jackal

Wunderbar in Corbett gesehen, später noch 3 mal bei Ranthambore und Keoladeo

Rotfuchs , *Vulpes vulpes* , Red Fox

Ein Tier auf dem Weg in der Pangot Gegend, früh am Morgen

Lippenbär , *Melursus ursinus* , Sloth Bear

2 mal in Ranthambore, das zweite mal fantastisch, nah und lange

Leopard , *Panthera pardus* , Leopard

Ein wurde gut aber leider nur kurz in Zone 6 in Ranthambore gesehen

Tiger , *Panthera tigris* , Tiger

Wir hatten 2 Sichtungen an einem Nachmittag – ein Männliches Tier kurz aber Nah und ein Weibchen mit 3 ausgewachsenen Jungen die wir lange beobachtet konnten

Sumpfkatze , *Felis chaus* , Jungle Cat

Eine kurz, von nur manchen in der Chambal Gegend gesehen

Indischer Elefant , *Elephas maximus* , Indian Elephant

Zwei Tiere wurden im sehr langen Gras in Dhikala gesehen

Wildschwein , *Sus scrofa* , Wild Boar

2 in Corbett, dann mehrere in der Ranthambore

Nordindischer Muntjak , *Muntiacus vaginalis* , Northern Red Muntjac

Mehrere gut in den Bergwäldern gesehen

Axishirsch / Chital , *Axis axis* , Spotted Deer / Chital

Viele in Corbett und Ranthambore

Sambarhirsch , *Rusa unicolor* , Sambar

Gut gesehen in Corbett und Ranthambore

Nilgai , *Boselaphus tragocamelus* , Nilgai

Täglich auf der Tiefebene, gute Sichtungen zB bei Soorwal und Keoladeo

Indische Gazelle , *Gazella bennetti* , Indian Gazelle

4 gut in Zone 6, Ranthambore

Grauer Goral , *Naemorhedus goral* , Grey Himalayan Goral

Ein weit weg in der Pangot Gegend

Gangesdelfin , *Platanista gangetica* , Ganges River Dolphin

Selten: im Chambalfluß haben wir ein Tier beim atmen gesehen

Reptilien

Sumpfkrokodil , *Crocodylus palustris* , Mugger Crocodile

An 5 Tagen gesehen, am besten auf der Bootsfahrt auf dem Chambalfluß

Ghaviäl , *Gavialis gangeticus* , Gharial

Fantastisch gesehen am Chambalfluß, etwa 9 ins gesamt

Bengalwaran , *Varanus bengalensis* , Bengal Monitor
Kurz bei Ranthambore und sehr gut in Keoladeo gesehen

Verschiedenfarbige Schönechse , *Calotes versicolor* , Oriental Garden Lizard
Sultanpur und in der Nähe vom Kosifluß

Heller Tigerpython , *Python molurus* , Indian Python
Ein sehr großes Individuum wurde in Keoladeo gesehen

Fischernatter *Fowlea piscator* Chequered Keelback
Im Kosifluß und beim Soorwalsee

Indische Zeltschildkröte , *Pangshura tentoria* , Indian Tent Turtle
Chambalfluß

Bengalische Flussschildkröte , *Batagur kachuga* , Red-crowned Roofed Turtle
Eine Seltenheit – eine am Chambalfluß

Ganges-Weichschildkröte , *Nilssonia gangetica* , Ganges Softshell Turtle
Gut gesehen – Ranthambore, Keoladeo und Chambalfluß

